

Nota Técnica 87836

Data de conclusão: 02/08/2022 11:40:22

Paciente

Idade: 55 anos

Sexo: Feminino

Cidade: Caxias do Sul/RS

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Federal

Vara/Serventia: 3ª Vara Federal de Caxias do Sul

Tecnologia 87836

CID: B44.0 - Aspergilose pulmonar invasiva

Diagnóstico: Aspergilose pulmonar invasiva

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: VORICONAZOL

Via de administração: VO

Posologia: voriconazol 200mg 140 comprimidos. Tomar 1 comprimido 2 vezes ao dia, por 10 semanas.

Uso contínuo? -

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Não

Oncológico? Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: VORICONAZOL

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: itraconazol, anfotericina B complexo lipídico e anfotericina B deoxicolato.

Existe Genérico? Sim

Existe Similar? Sim

Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar: Vide a tabela CMED

Custo da Tecnologia

Tecnologia: VORICONAZOL

Laboratório: -

Marca Comercial: -

Apresentação: -

Preço de Fábrica: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: 3.024,56

Preço Máximo ao Consumidor: -

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal

Tecnologia: VORICONAZOL

Dose Diária Recomendada: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Fonte do custo da tecnologia: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: VORICONAZOL

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O voriconazol é produzido por diversas empresas farmacêuticas em apresentações para uso por via endovenosa e por via oral. A apresentação por via oral está disponível em comprimidos de 50 mg e 200 mg. Com base na prescrição juntada ao processo e consulta à tabela CMED, acrescido ICMS de 17%, foi elaborada a tabela acima para 180 dias de tratamento.

Na 107ª reunião ordinária da CONITEC houve recomendação preliminar de incorporação do Voriconazol para tratamento de Aspergilose invasiva. Na análise econômica submetida para apreciação do órgão público, Voriconazol foi dominante frente às alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (Anfotericina B complexo lipídico e Anfotericina B deoxicolato). Além disso análise de impacto orçamentário antecipou economias da ordem de 83 milhões de reais em 5 anos [\(13\)](#). Atualmente esta recomendação está em fase de consulta pública.

Em estudo de realidade europeia (Holanda), conduzido por Jansen et al. [\(14\)](#), o uso de Voriconazol comparado com Anfotericina B ou Itraconazol demonstrou-se custo efetivo. Quando comparado com o agente poliênico, voriconazol foi dominante (com redução de custo de 965,28 euros por semana de vida ganho) ao final de 12 semanas de tratamento. Quando comparado com Itraconazol, Voriconazol esteve associado a um incremento de custo de 7800 euros por ano de vida adicional.

Análise de custo e efetividade foi realizada por Morfín-Otero et al. avaliando diferentes antifúngicos para profilaxia de IFI em paciente com transplante de células hematopoiéticas no México [\(15\)](#). Este estudo concluiu que o voriconazol foi a droga mais custo-efetiva dentre as analisadas (voriconazol, fluconazol e anfotericina B). Mais recentemente, uma análise de custo-efetividade comparando fluconazol, itraconazol, posaconazol e voriconazol em indivíduos que realizaram transplante de células hematopoiéticas na Espanha concluiu que a economia com voriconazol era cerca de € 4.707,00 por paciente em comparação com posaconazol oral, com menos mortes e IFIs com voriconazol [\(16\)](#). Apesar de não constar nos autos do processo que a paciente encontra-se em avaliação para transplante de medula óssea, consideramos que o planejamento terapêutico atual é condição análoga com período de imunossupressão prolongada, particularmente por 3-6 meses. Adicionalmente, consideramos que a equipe assistente pode considerar essa alternativa terapêutica em um futuro próximo.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: tratamento da aspergilose pulmonar invasiva, melhora da capacidade pulmonar e redução de mortalidade e rejeição crônica do enxerto.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada

Conclusão

Tecnologia: VORICONAZOL

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: A parte autora apresenta diagnóstico provável de aspergilose pulmonar invasiva através de dosagem de galactomanana em lavado broncoalveolar e alterações em anastomoses brônquicas. Ainda que estejamos extrapolando estudo que incluiu em maior parte pacientes portadores de malignidades hematológicas, tendo em vista benefício clínico em comparação direta com alternativa disponível no SUS e a sua custo-efetividade vantajosa, corroborada em análise recente da CONITEC, trata-se da terapia de escolha neste cenário.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: 1. [Epidemiology and clinical manifestations of invasive aspergillosis - UpToDate \[Internet\]. \[citado 1o de outubro de 2021\]. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-clinical-manifestations-of-invasive-aspergillosis?search=aspergilose&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-clinical-manifestations-of-invasive-aspergillosis?search=aspergilose&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1)

2. Bergamasco MD, Pereira CAP, Arrais-Rodrigues C, Ferreira DB, Baiocchi O, Kerbauy F, et al. [Epidemiology of Invasive Fungal Diseases in Patients with Hematologic Malignancies and Hematopoietic Cell Transplantation Recipients Managed with an Antifungal Diagnostic Driven Approach. J Fungi Basel Switz. 23 de julho de 2021;7\(8\):588.](#)

3. [nota-tecnica-04-2021-infeccoes-fungicas-e-covid19.pdf \[Internet\]. \[citado 2 de novembro de 2021\]. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-04-2021-infeccoes-fungicas-e-covid19.pdf](#)

4. Koehler P, Bassetti M, Chakrabarti A, Chen SCA, Colombo AL, Hoenigl M, et al. [Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. Lancet Infect Dis. junho de 2021;21\(6\):e149–62.](#)

5. Solé A, Morant P, Salavert M, Pemán J, Morales P; Valencia Lung Transplant Group. Aspergillus infections in lung transplant recipients: risk factors and outcome. Clin Microbiol Infect. 2005 May;11(5):359-65. doi: 10.1111/j.1469-0691.2005.01128.x. PMID: 15819861.

6. Ministério da Saúde. [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS \(CONITEC\). Voriconazol para tratamento de pacientes com aspergilose invasiva. Abril de 2022. http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2022/20220428_Relatorio_voriconazol_aspergilose_invasiva_CP_29.pdf](#)

7. [Risk of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia - UpToDate \[Internet\]. \[citado 24 de novembro de 2021\]. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/risk-of-infections-in-n-patients-with-chronic-lymphocytic-leukemia?sectionName=Humoral%20immunity&search=CLL%20immunoglobulins&topicRef=1405&anchor=H1198496&source=see_link#H1198496](#)

8. Johnson LB, Kauffman CA. Voriconazole: a new triazole antifungal agent. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 1o de março de 2003;36(5):630–7.

9. Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med. 2002;347(6):408-415. doi:10.1056/NEJMoa020191

10. Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2016;63(4):e1-e60. doi:10.1093/cid/ciw326

NatJus Responsável: RS - Rio Grande do Sul

Instituição Responsável: TelessaúdeRS-UFRGS

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: A parte autora anexa laudo informando ser portadora de aspergilose pulmonar invasiva. Informa ter sido submetida a transplante pulmonar em janeiro de 2022, apresentando no momento piora clínica (tosse produtiva e redução da capacidade pulmonar). Foi diagnosticada com aspergilose pulmonar invasiva em março/2022, através de dosagem de galactomanana em lavado broncoalveolar (LAUDO10, página 3); suspeita-se de infecção (e não apenas colonização por *Aspergillus* sp.) pela piora clínica da paciente e por elevada quantidade de fibrina em anastomoses brônquicas visualizadas em fibrobroncoscopia, motivo pelo qual pleiteia o medicamento voriconazol.

A aspergilose é uma infecção causada por fungos do gênero *Aspergillus*, que pode causar manifestações relacionadas a reações imunes alérgicas ou relacionadas à invasão direta dos tecidos (1). Também é fungo ubíquo, está presente em qualquer ambiente e entre os fatores de risco clássico para desenvolvimento de infecção fúngica invasiva estão: neutropenia grave duradoura ($< 100/\text{mm}^3$ por mais de 4 dias), uso de altas doses de corticóides e uso de imunossupressores (1,2). Seu diagnóstico pode ser feito por exame micológico direto, cultura em meio adequado ou anatomopatológico, suas hifas são finas, frequentemente septadas e ramificadas de maneira simétrica. Frequentemente pacientes têm o diagnóstico presumido pela combinação de achados radiológicos (à tomografia computadorizada de tórax nódulos, “sinal do halo”) associados a marcadores sorológicos (1,3-Beta-D-Glucana ou Galactomanana). O tratamento da aspergilose é feito com agentes ativos contra fungos filamentosos como o voriconazol, posaconazol, isavuconazol e alternativamente anfotericina B. Também é recomendado que o tratamento dure até resolução clínico-radiológica dos sinais da doença, recomenda-se a sua realização por 6-12 semanas (3,4).

A aspergilose pulmonar invasiva é infecção comum em pacientes com pulmão transplantado; está associada com infecção de anastomoses (região onde o pulmão transplantado é conectado à via aérea do receptor), rejeição crônica do enxerto e maior mortalidade. Estudo retrospectivo avaliando 251 receptores de pulmão transplantado encontrou mortalidade de 14% em pacientes com traqueobronquite, 28% naqueles com colonização e 78% com infecção invasiva por *Aspergillus* sp., sugerindo aumento da mortalidade mesmo em pacientes colonizados na ausência de infecção. (5)